

?
Que faire
après
la détection
du frelon
asiatique

Le signalement est impératif !

ATTENTION

En présence
d'un nid, ne jamais
entreprendre de le
détruire seul.
Cette démarche très
dangereuse doit être
réalisée par un
professionnel.

1 J'appelle la FDGDON*
de mon département



2 La FDGDON* procède
à l'identification de l'espèce



3 la FDGDON* organise
la destruction du nid



* Fédération Départementale des Groupements
de Défense contre les Organismes Nuisibles

Qui contacter

Un interlocuteur par département



Les FDGDON en Bretagne

Côtes d'Armor :
FECODEC - Ploufragan > tél : 02.96.01.37.90

Finistère :
FEFIDEC - Guipavas > tél : 02.98.43.04.44

Ille-et-Vilaine :
FEVILDEC - Rennes > tél : 02.23.48.26.23

Morbihan :
FEMODEC - Vannes > tél : 02.97.63.09.09

PARTENAIRES

Les 4 groupements
de défense sanitaire
apicole de Bretagne



La Feredec
Bretagne



La Région
Bretagne



plaquette
financée par le
Conseil Régional
de Bretagne

Credits photos : David DEFOORT - FDGDON 44 - FEVILDEC

Le frelon asiatique

Vespa velutina

Une nouvelle espèce invasive en Bretagne



RÉSEAU DE LUTTE ET DE SURVEILLANCE

Fédérations Départementales des Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles
Les Groupements de Défense Sanitaire Apicole de Bretagne



Reconnaissance - Identification



Taille de 2 à 4 cm



Taille de 2 à 3 cm

Le frelon asiatique possède une couleur sombre avec une large bande orangée à l'extrémité de l'abdomen.

Il se différencie du frelon commun (photo de gauche) qui est de taille supérieure avec une couleur à dominante jaune.



Le frelon asiatique est un **redoutable prédateur d'abeilles**

Reconnaissance du nid

Le nid ne constitue pas à lui seul un critère d'identification fiable.

Cependant, certaines caractéristiques doivent alerter l'observateur :

- > Il est souvent installé à la cime d'un arbre, quelquefois sous un abri aéré.
- > Sa taille est importante : entre 40 et 80 cm de diamètre.
- > Il possède une entrée unique.



Pourquoi lutter ?

Des enjeux sanitaires, économiques et environnementaux

- Un risque pour la santé publique
> La piqûre du frelon asiatique peut être mortelle.
- Un risque pour l'apiculture
> Destruction des ruches
- Un risque pour la pollinisation.

Comment lutter ?

Avec un réseau de surveillance adapté mobilisant les GDS et apiculteurs bretons pour :

- Localiser les foyers et connaître la progression de l'espèce.
- Détruire les nids identifiés
- Capturer les fondatrices en début de printemps et en automne.
- Protéger les élevages apicoles et préserver la pérennité des ruchers.



Un outil adapté : le piège sélectif

À placer près des ruches, d'un point d'eau ou d'arbres fruitiers. Les insectes non recherchés peuvent se libérer.

Fabrication de l'appât

- ▶ Une tasse de vin blanc
- ▶ Une tasse de bière brune
- ▶ Une tasse de sirop de framboise